Limnaea stagnalis var. turgida, Menke.	Petersburger Graben.
„ palustris, Müller.	Petersburger Graben und Hartlager Holz.
var. turricula, Held.	Petersburger Graben.
var. corvus, Gmel.	Petersburger Graben.
var. fusca, C. Pfr.	Hartlager Holz.

(Schluss folgt.)

Literaturbericht.

Ancey, C. F., Caractères conchyliologiques des groupes principaux proposès par les auteurs dans les genres Hyalina, Sagda, Zonites, Macrocyclis et Leucochroa. — In: le Naturaliste p. 214.

Der Autor scheint die neuere Literatur nicht zu kennen und berücksichtigt die anatomischen Untersuchungen gar nicht. Ganz neu sind die Angaben, dass einige ächte Zonites links gewunden sind und dass alle Hyalinen einen weit offenen Nabel haben.

Stossich, Adolfo, il Carso liburnico. — In Bolletino Soc. Adriatica V. 2. 1880. p. 1—19.

Enthält in dem Bericht über eine Excursion nach dem liburnischen Karst zahlreiche Angaben über gesammelte Mollusken; eine Anzahl neuer Arten werden vorläufig genannt und sollen später beschrieben werden.

Stossich, Michele, Prospetto della Fauna del mare Adriatico. II. Mollusca. — In Bollet. Soc. Adriat. V. 2. 1880. p. 55.

Enthält die Aufzählung sämmtlicher in der nördlichen Adria incl. Dalmatien beobachteten Mollusken. Der Autor hat einige Irrthümer Brusina's allzu religiös conservirt; so führt er Voluta pumilio auf, obschon dieselbe längst als junge Cypraea entlarvt ist, Natica canrena, welcher Name der westindischen Art zukommt, Triton variegatum — oder sollte Tr. Seguenzae wirklich in der Adria vorkommen und nodiferum fehlen? — die westindische Trivia pediculus neben europaea und pulex etc. Charakteristisch für die adriatische Fauna ist das Fehlen mancher sonst im Mittelmeer verbreiteter Arten, wie Triton corrugatus, cutaceus, parthenopeus, Ranella gigantea, Cassis suburron, aller ächten Pleurotoma, der Cypraea lurida etc., die unmöglich übersehen sein können.

Martens, Eduard von, Conchologische Mittheilungen, als Fortsetzung der Novitates herausgegeben von . . . . Cassel, bei Th. Fischer. Heft 1—2. Mit 6 Tafeln.

Wir begrüssen mit Freude den Anfang eines neuen Unternehmens, welches bestimmt ist, an die Stelle der eingegangenen Novitates zu treten, aber mehr in der Art und Weise der Philippi'schen Abbildungen und Beschreibungen etc. gehalten werden soll. Die beiden vorliegenden Hefte sind den Heliceen gewidmet und enthalten folgende Arten: Taf. I: Nanina obliquata Rve. fig. 1—3; N. virens Mart. fig. 4—9; — Taf. II: Hel. Salvatoris Pfr. fig. 1—3; Hel. Macgregori Cox fig. 4—6; Hel. Alfredi var. trichroa n. von Neu-Irland fig. 8—10; — Taf. III: Hel. Schrencki Midd. fig. 1—3; Hel. Talischana n. sp. fig. 4—7 von Lenkoran; Hel. Circassica Charp. fig. 8—10; Hel. Arpatschaiana var. Sewanica n. aus Armenien fig. 11—14; Hel. aristata Kryn. fig. 15—17; Hel. globula Kryn. fig. 18—20; — Taf. IV: Hel. rubens Mart. fig. 1—6; Hel. helvola Friv. fig. 7—9; — Hel. Semenowi Mart. fig. 10—13; Hel. rufispira var. albidorsalis Mouss. n. fig. 18—20; Hel. Nordenskioldi Westerl. fig. 14—17. — Taf. V. fig. 1—3 Hel. cucullus v. Mart. von Malta; 4—7 Hel. circumornata Fér. (scheint mir zu carseolana zu gehören); 8—10 Hel. gyrostoma Fér. von Tripoli; 11—13 Hel. Leachi Fér. von ebenda. — Taf. VI. fig. 1. 2 Buliminus labrellus n. sp. aus der Dsungarei; fig. 3. 4. Bul. oxianus Mart; fig. 7—7 Bul. Sogdianus Mart.; fig. 8. 9 Bul. secalinus Mouss. n. sp. Kuldscha; fig. 10. 11. Bul. intumescens Mart.; fig. 12—14 Bul. asiaticus Mouss. n. sp. aus Kuldscha; fig. 15—18 Bul. retrodens Martens. — Wir empfehlen das sehr hübsch ausgestattete Unternehmen unseren Mitgliedern bestens.

Riemenschneider, C., Beitrag zur Molluskenfauna des Harzes. In Zeitschr. f. ges. Naturwiss. vol. LIII. p. 431 ff.

Es werden 84 Arten aufgeführt, davon 6 nackte, 53 Land-, 19 Süsswasserschnecken und Muscheln. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen von Hyal. alliaria Mill.

Bergh, Dr. R., Beiträge zur Kenntniss der japanischen Nudibranchien. I. — In Verh. zool. bot. Ges. 1880. p. 155 ff.

Als neu beschrieben werden Rizzolia modesta, Melibe vexillifera, Scyllaea bicolor, Pleurophyllidia comta, Linguella fallax, Doriopsis nigra var. coerulea, Trevelyana inornata, Halgerda formosa n. gen. et spec., sämmtlich aus Südjapan.

Joural of Conchology, vol. II. No. 12. (Schluss).

p. 353. *Petterd, W. F.*, Critical Remarks on the Rev. J. E. Tenison Woods Census of Tasmanian Shells.

p. 355. *Petterd, W*, Descriptions of three new Helices from Australia. — (Hel. Fernshawensis, Dendenongensis und Otwayensis aus Victoria).

p. 356. *Scharff, Robert*, Notes on a hybrid Rumina decollata.

p. 357. *Petterd, W. F.*, Note on Hel. Weldii Woods.

Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet ed. II.

Lfg. 291. 292. Fusus von Kobelt.

Lfg. 293. Paludomus, von Dr. A. Brot. Neu Palud. rapaeformis, madagascariensis, inflatus.

Lfg. 294. Mactra von H. C. Weinkauff.

Kobelt, W., Illustrirtes Conchylienbuch. Neunte Lieferung.

Enthält den Schluss der Stylommatophoren, die Basommatophoren und Solenconchae, sowie den Anfang der Acephalen.

Journal de Conchyliologie XXVIII. tome 3.

p. 205. *Vayssière, Albert*, Note sur les Coquilles des differents espèces de Pleurobranches du golfe de Marseille. (Neu Pl. Monterosatoi p. 212 t. 7 fig. 5).

p. 216. *Oehlert, D.*, Position systematique des Brachiopodes d'après M. Dall.

p. 234. *Fischer, P.*, Monstruositè sènestre d'une Telline.

p. 235. *Folin, Marquis L. de*, un nouveau Mollusque trouvé dans les alluvions du Rhône (Locardia apocrypha n. gen. et spec.).

p. 238. *Fischer, P.*, sur la classification des Mollusques.

p. 240. *Bayle, E.*, Liste rectificative de quelques noms de genres et d'espèces.

Der Autor macht sich das Vergnügen, eine Anzahl Gattungsnamen zu verändern, weil sie schon bei Insecten vergeben sind. Auch Tritonium muss sich einen neuen Angriff gefallen lassen, Tr.

nodiferum kommt in die Gattung Buccinum Tournefort! (Warum nicht lieber die Gattung Buccinum von Virgil datiren ?)

p. 251. *Depontaillier, J.*, Note sur l'Aplysia grandis Philippi et l'Aplysia deperdita Phil.

p. 256 *Tournouër, R.*, Description d'un Ostrea fossile de la mollasse miocène de Forcalquier (O. Sellei).

Wimmer, August, Zur Conchylienfauna der Galopagos-Inseln. In Sitzungsber. der k. Acad. d. Wissensch. Vol. 80. Abth. 1. Dec. 1879.

Gestützt auf die von Dr. Habel 1868 gemachten Sammlungen werden 103 Arten aufgezählt, davon keine neu. Es sind zunächst eine Anzahl eigenthümlicher Arten (Purpura columellaris, planospira, grandis, Latirus varicosus, Turbinella tuberculata etc.), dann als Hauptmasse die typisch westamerikanischen Arten, zu denen sich einige Polynesier (Coralliophila madreporarum, Columbella suffusa, Terebra strigata, Lucina fibula) und Kosmopoliten (Triton pileare) mengen. Mit Westindien gemein ist Volvaria rubella C. B. Ad.

Malacozoologische Blätter, Neue Folge. Bd. II. Bog. 9—11.

p. 115. *Bergh, Rud.*, die Gattung Goniodoris Forbes. Mit Tafel 4.
p. 138 *Clessin, S.*, Beitrag zur Molluskenfauna von Unterfranken.
p. 151. — — Beitrag zur Molluskenfauna des nördlichen Schwedens.
p. 155. — — Farblose Hel. obvoluta.
p. 158. — — Planorbis dispar Westerl.
p. 161. — — Studien über die Familie der Paludinen.

Heude, R. P. Conchyliologie fluviatile de la province de Nanking et de la Chine centrale. Fasc. VI. Pl. 41 bis 48. Paris, chez Savy.

Als neu beschrieben werden: Anodonta bigibba, despecta, obtusa, navicella, orbicularis, limosa, livida, castanea, minuta, succinea, Cheniana. scaphydium, puerorum, indecora.

Le Naturaliste No. 26.

p. 206. *Ancey, C. F.*, Description d'une espèce nouvelle de Mollusque (Sunetta Clessini).

p. 206. *Granger, A.*, les Coquilles rares (suite).

p. 207. *Ancey, C. F.*, note sur les coquilles du genre Oliva.

de Betta, Edoardo, Intorno agli Studi per una Malacologia terrestre e fluviatile dell' Italia. — In Atti R. Inst. Venezia Ser. V. t. 11.

Enthält eine sehr interessante Geschichte der Entwicklung der italienischen Lokalfaunistik.

Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet.

Lfg. 290. Helix, von *Dr. H. Dohrn.* Die Abbildungen, in Farbendruck bei Werner & Winter in Frankfurt ausgeführt, stechen erheblich von den früheren ab und werden es die Abonnenten wohl kaum schmerzlich empfinden, dass nun statt 6 nur 5 Tafeln pro Lieferung gegeben werden.

Mittheilungen und Anfragen.

Eine nach Dr. Stein geordnete Sammlung Süsswasserschnecken der Umgegend Berlins, unter denen sich ein zur Form β polita gehöriges Exemplar Acicula fusca befindet. Preis 100 Mark.

Ferner eine bedeutende Meeres-Conchylien-Sammlung enthaltend 40 Arten Cypraea, 30 Conus, 10 Strombus, viele grosse Cassis, Fusus proboscidiferus, Pterocera bryonia, Pinna, Cytherea Dione, Haliotis Iris et gigantea, Cerithium ebeninum et telescopium, Hippopus maculatus, Voluta scapha, rupestris, Cardium pseudolima, Murex radix, Pecten ziczac, pleuronectes etc. etc. Preis 250 Mark.

M. M. Shepman in Rhoon bei Rotterdam wünscht Monographien der zweischaligen Mollusken von Reeve, Sowerby u. s. w. zu kaufen und bittet um Preisangabe.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder.

Paa, Ludwig, in Hall, Tirol.

Wohnungsveränderung:

Hesse, P., wohnt jetzt Cellerstrasse 3 b in Hannover.

Eingegangene Zahlungen.

Riemenschneider, N., 6. —; Andreis, J. 23. —; Sterki, Schleitheim 21. —; Blum, Fft. 6. —; Thièsse, Ch. 20. 80.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.